

SELBST VERSTÄNDLICH IMPFFEN

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den
Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Der Impfkalender ist nun in den Sprachen Albanisch, Arabisch,
Bulgarisch, Dari, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch,
Kroatisch, Kurdisch, Pashto, Polnisch, Rumänisch, Russisch,
Serbisch, Spanisch, Tigrinya, Türkisch, Urdu und Vietnamesisch
kostenlos als Download verfügbar.



IMPFKALENDER

Empfehlungen der Ständigen
Impfkommision (STIKO), 2018/19.
www.stiko.de

ALTER	(in Wochen)	Säuglinge		(in Monaten)		Kleinkinder		Kinder			(in Jahren)		Jugendliche		Erwachsene	
	6	2	3	4	11–14	15–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60		
			U4			U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1					
IMPfung																
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		N	A ^f (alle 10 Jahre, ggf. N)			
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		N	A ^f (alle 10 Jahre, ggf. N)			
Keuchhusten Pertussis		G1	G2	G3	G4	N		A1	N	A2		N	A ^f (ggf. N)			
Kinderlähmung Poliomyelitis		G1	G2 ^a	G3	G4	N					A1		N	ggf. N		
Hepatitis B		G1	G2 ^a	G3	G4	N										
Hib Haemophilus influenzae Typ b		G1	G2 ^a	G3	G4	N										
Pneumokokken ^g		G1		G2	G3	N									S ^c	
Rotaviren	G1 ^b	G2	(G3)													
Meningokokken Serogruppe C					G1 (ab 12 Monaten)		N									
Masern					G1	G2	N							S ^d		
Mumps Röteln					G1	G2	N									
Windpocken Varizellen					G1	G2	N									
Grippe Influenza											S (jährlich)					
HPV Humane Papillomviren											G1 ^e	G2 ^e	N ^e			

ERLÄUTERUNGEN

G	GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
S	STANDARDIMPFUNG
A	AUFRISCHIMPFUNG
N	NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
U	Früherkennungsuntersuchung
J	Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
c Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.
d Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.

- e Standardimpfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Für Nachholimpfungen und Anzahl der Impfstoffdosen Fachinformation beachten.
f Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
g Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.

ROBERT KOCH INSTITUT



In weiteren 19 Sprachen unter www.rki.de/impfkalender erhältlich!

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages